

Výživa a stimulace cukrovky

Cukrovka uzavírá meziřadí a je vhodný čas na sólo vstup s listovou výživou a stimulatorem na podporu vývoje bulvy. Stejně doporučení bude platit, pokud tento vstup budete následně kombinovat s prvním fungicidním ošetřením. Výhodné v cukrovce je stimulační hnojivo BOROSTIM, které kombinuje dodávku B, N, Mo a stimulačních látek. Vhodné je opakované použití vzhledem k délce vegetace.

Pokud nevyvstane potřeba cílené stimulace růstu, ačkoliv tuto vnímáme v cukrovce spíše jako prostředek ke zvýšení výnosu, ovlivnění cukernatosti a další jakostních parametrů než součástí nějakých regeneračních vstupů, nabízíme i varianty pouze s listovou výživou. Nemusí se už jednat jen o listovou dodávku bóru, ale přidat i další živiny v komplexním hnojivu, které ovšem obsahuje bór jako dominantní mikroprvek. Například hnojivo K2 kombinuje N,P,K, B a další mikro a benefiční prvky. Hnojivo je také možno použít opakovaně a nebo střídavě kombinovat pouze s dodávkou bóru.

Doporučení k porostům:

BOROSTIM 2,0-2,5 l/ha (stimulace, bór, molybden)

nebo

K2 2,0-3,0 l/ha (N, P, K, B, Mn, Zn, Mo, Ni, Ti)