

Řepka – konec kvetení, vývoj šešulí

Porosty řepky jsou aktuálně ve fázi kvetení. Někde spíše dokvétání, v závislosti od polohy a odrůdy. Někde byl fungicid proti houbovým chorobám aplikován nedávno, někde teprve bude a jsou oblasti, kde už účinek této aplikace spíše doznívá. Celkově díky počasí probíhá kvetení řepky rychle, často již s nedostatkem vláhy.

V kombinaci s **fungicidy doporučujeme stále využít AKTIFOL Sulf**. Nosná složka AMIX tohoto přípravku (aminokyseliny, lignosulfáty, krátkořetězcové polysacharidy a další látky) zvyšuje účinnost fungicidů i na primárně necílové choroby.

Dále bude možné využít thiosíranovou formu síry i v rámci ošetření společně s „lepením“ šešulí. Například kombinací lepidel, thiosíranů a roztoku močoviny (Zdroj: SPZO, Ing. Říha), může dojít na povrchu šešulí k vytvoření prostředí nevhodnému ke klíčení a šíření spór celé řady houbových chorob a tím se vhodně podpoří a prodlouží účinek fungicidní ochrany řepky. K takovému použití se hodí například přípravek FOLIT ThioSulf.

Doporučení do případné kombinace s fungicidy:

Fungicid + AKTIFOL Sulf 2,0 l/ha

Doporučení do kombinace s lepením šešulí:

Přípravek k lepení nebo k jednotnému dozrávání + FOLIT ThioSulf 2,0-3,0 l/ha + 5-10% roztok močoviny či DAM