

# FOLIT® Síra

800 SC

Čistý  
objem:

10 l

Obsah živin: 57% hm., tj. 800 g/l elementární síra

Číslo vzájemného uznání: V332



## OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ

Spĺňuje zákonem stanovené limity (mg/kg hnojiva): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

## ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

Folit® Síra je určen k aplikaci na list, k odstranění deficitu síry v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem síry některými plodinami, zejména intenzivně pěstovanými olejninami a obilovinami. Hnojivo doporučujeme spíše v časnějších růstových fázích, vzhledem k dlouhodobému působení na listu a doplňkovému fungicidnímu účinku.

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Folit® Síra se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. Nepoužívat v případě silného slunce, vysokých teplot a silného větru. Při stanovení konkrétní aplikační dávky v rámci doporučeného rozmezí je vhodné vycházet z předchozích rozborů rostlin či půd, dlouhodobé znalosti výživných poměrů stanoviště, předplodiny, kvality a úrovně základního hnojení, růstové fáze plodiny a klimatických podmínek. Nižší dávky volíme při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.



## SKLADOVÁNÍ

Hnojivo skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, mrazem a ohněm. Hnojivo je za dodržování předepsaných podmínek skladování a užívání stabilní, nepodléhá rozkladu, nepodléhá nebezpečným reakcím a neuvolňuje do prostředí nebezpečné rozkladné produkty. Proto za přesného dodržování předepsaných aplikačních podmínek nehrozí při použití hnojiva nebezpečí ohrožení životního prostředí. Hnojivo je nehořlavé. Při požáru jsou povolena použít všechna hasící média. V případě použití vody zajistěte, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do veřejné kanalizace a nezasáhla zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

## PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Před použitím kanystr protřepejte pro získání homogenní suspenze. Za současného použití všech přípustných komponent v nádrži postřikovače (v 2/3 objemu naplněného vodou), při zapnutém míchadle rozpusťte v následném pořadí: síran hořečnatý, močovina, rozředěný Folit® Síra, rozředěný další listové hnojivo i pesticid podle návodu na jeho použití. Nádrž doplňte vodou. Aplikační kapalinu spotřebujte hned po smíchání a postřik provádějte při stále zapnutém míchadle. Jedná se o suspenzní hnojivo. Nedoporučuje se používat u postřikovačů osazených filtračními prvky 80 MESH a více.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

H315 Dráždí kůži. P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ ochranný oděv/ univerzální ochranné brýle nebo střední obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Používat pouze v případě skutečné potřeby! Nepřekračovat doporučené dávkování!

Plodina	Dávkování	Termín aplikace	Počet aplikací
	(l/ha)		
Obiloviny	3,0–6,0	Od 3-4 listů do počátku metání.	1–3
Řepka	3,0–6,0	Od 5-8 listů do odkvětu.	2–4
Kukuřice	4,0–6,0	Od 4. listu do posledního postřiku.	2–3
Cukrovka	3,0–6,0	Od 4. listu do uzavření meziřádků.	1–2
Jabloň	3,0–6,0	Od fáze zárodku plodů v intervalu 10-14 dnů.	1–3
Zelenina	3,0–6,0	Preventivní postřiky nebo v okamžiku zjištění deficitu síry.	1–2

## LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ

Prázdné obaly od hnojiva, pracovní nástroje a pomůcky vypláchněte dostatečným množstvím vody tak, aby bylo dosaženo minimálně doporučeného ředění hnojiva pro aplikaci. Získaný roztok aplikujte výhradně na ošetřeném pozemku. Takto vypláchnuté obaly lze uložit do separovaného odpadu. Zbytky dále již nepoužitého hnojiva (jakkoliv znehodnoceného), jakožto i obaly znečištěné nepoužitelným hnojivem patří do nebezpečného odpadu, se nesmí dostat do kanalizace a vodotečí a je nutné je odevzdat na místech k tomuto účelu určených orgány státní správy nebo do zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.

**Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.**

Datum výroby, číslo šarže:

Doba použitelnosti: 36 měsíců ode dne výroby.



**VAROVÁNÍ**

**CHEMAP  
AGRO®**

Dovozce: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03  
tel.: 603 848 617, [www.chemapagro.cz](http://www.chemapagro.cz)

Výrobce: Zaklady Chemiczne „Siarkopol“  
TARNOBRZEG Sp. z o.o., Polsko

