

TOPSIL®

NA VRCHOLU SIL

**CHEMAP
AGRO**

NA VRCHOLU SIL

chemapagro.cz

TOPSIL®

Silné, zdravé a odolné obiloviny

- Zesílení buněčných stěn a stébel – křemík + aminokyseliny (AMK)
- Udržení zdravotního stavu a asimilační plochy – pH + výživa + AMK
- Lepší hospodaření s vodou, odolnost proti stresům – výživa (Si, K, B) + AMK
- Dvě jarní aplikace – začátek sloupkování, metání

TOPSIL®

NA VRCHOLU SIL



Použití v pšenici ozimé 2x Topsil 1,0 l/ha

Varianta	Dítana 2021 výnos		Dítana 2022 výnos		Dítana 2023 výnos		CZU 2023 výnos	
	t/ha	%	t/ha	%	t/ha	%	t/ha	%
Kontrola	9,8	100,0	11,7	100,0	5,9	100,0	13,3	100,0
2x Topsil 1,0 l/ha	10,9	111,8	13,1	111,4	6,3	106,9	14,2	107,0

Výsledky z provozních ploch 2023

Výnos pšenice	Kontrola	2x Topsil 1,0 l/ha
	t/ha	t/ha
Benešovsko	8,84	9,24
Rakovnicko	6,81	6,92
Plzeňsko	4,94	5,39
Příbramsko	6,89	6,93
Královéhradecko	7,00	7,80
Průměr	6,896	7,256



První aplikace na začátku sloupkování v 1,0 l/ha – posílení stébla pšenice.

Použití v ječmeni jarním 2x Topsil 1,0 l/ha

Varianta	Dítana 2022 výnos		Dítana 2023 výnos	
	t/ha	%	t/ha	%
Kontrola	8,4	100,00	9,1	100,00
2x Topsil 1,0 l/ha	8,7	103,1	9,7	106,7



Okr. Plzeň-sever 2023
TOPSIL aplikovaný ve dvou termínech
v jarním ječmeni – hospodaření s vodou



Okr. Rakovník 2023
Obdobně z jiné lokality – posílení stébla
ječmene po první dávce 1,0 l/ha.

Složení: 9,3% hm. vodorozpustný K₂O, 3% hm. vodorozpustný SiO₂, 0,25% hm. vodorozpustný B jako borethanolamin, 3,7% hm. volné aminokyseliny

Dávkování:

Plodina	Dávkování (l/ha)	Termín aplikace	Počet aplikací
Obiloviny	1,0	Od počátku sloupkování do konce kvetení.	1-2
Cukrovka	1,0	V letním období ve spojení s fungicidy.	2-3
Ostatní	1,0	Vždy před předpokládanou periodou sucha, případně jiných stresových podmínek nebo ihned po jejich skončení.	1-3

Poradenství: Jan Šamalík - tel.: 739 593 830, **Logistika:** Zlata Komárková - tel.: 724 909 414

CHEMAP
AGRO



agro@chemapagro.cz
www.chemapagro.cz