

M-SUNAGREEN®

MOŘENÍ JE ZÁKLAD SÍLY



ČESKÝ VÝROBEK

Čistý
objem: **10 l**

Číslo rozhodnutí
o registraci: 3431

Složení: Kyselina 2-aminobenzoová 5,0 ± 0,5 g/l
Kyselina 2-hydroxybenzoová 2,5 ± 0,5 g/l
Hodnota pH 5,0 - 7,0



CHEMAP **AGRO**

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ

Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky):

Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

Druh úpravy přípravku:

SL – Postříkový přípravek ve formě kapalného koncentráту ředitelného vodou.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

M-SUNAGREEN® je pomocný rostlinný přípravek používaný jako rostlinný stimulant s formulací vyhovující použití jako součást kapaliny určené pro ošetření osiva. Aplikace na osivo se projeví ve zvýšení objemu kořenové soustavy (lépe vyživený vitálnější porost), v rovnoměrnějším a rychlejším vzcházení.

DÁVKOVÁNÍ

M-SUNAGREEN® lze v dávce uvedené v části „Registrované aplikace“ aplikovat na povrch semen ředěný vodou nebo přidat k použitému registrovanému mořidlu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ



Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, mrazem a ohněm. Přípravek je za dodržování předepsaných podmínek skladování a užívání stabilní, nepodléhá rozkladu, nepodléhá nebezpečným reakcím a nevolňuje do prostředí nebezpečné rozkladné produkty. Proto za přesného dodržování předepsaných aplikačních podmínek nehrozí při použití nebezpečí ohrožení životního prostředí. Přípravek je nehořlavý. Při požáru jsou povolena použít všechna hasící média. V případě použití vody zajistěte, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do veřejné kanalizace a nezasáhla zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

PŘÍPRAVA MOŘÍCÍ KAPALINY

Postup v případě kombinace přípravku M-SUNAGREEN® s registrovaným mořidlem:
– při přípravě se postupuje dle návodu použití zvoleného mořidla,
– objem přidávaného M-SUNAGREENU® nahrazuje totožný objem vody,
– mořící kapalina musí být spotřebována do 24 hodin od její přípravy.

Postup v případě samostatného (ředěného vodou) použití přípravku M-SUNAGREEN®:
– míchací nádrž se naplní objemem vody (dle použité technologie), orientačně je uveden v části „Registrované aplikace“,
– za stálého míchání se přidá množství přípravku M-SUNAGREEN® specifikované v části „Registrované aplikace“,
– mořící kapalina musí být spotřebována do 24 hodin od její přípravy.

Technologie aplikace:

Ošetření osiva přípravkem M-SUNAGREEN® se provádí na schválených kontinuálních i diskontinuálních (vsázkových) mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva mořící kapalinou.

M-Sunagreen® otevírá novou cestu v oblasti stimulace růstu polních plodin. Svým účinkem již od prvních fází vývoje zasahuje především do vývoje kořenového aparátu. Je součástí systému stimulace obilovin.

Pouze pro profesionální použití. Používat pouze v případě skutečné potřeby! Nepřekračovat doporučené dávkování!

REGISTROVANÉ APLIKACE

Plodina	Termín aplikace	Dávka na 1000 kg osiva (l/t)	
		M-Sunagreen®	voda
Obiloviny ozimé	ošetření osiva	1,5	8
Ječmen jarní	ošetření osiva	1,5	8
Mák setý	ošetření osiva	30	20
Kukuřice setá	ošetření osiva	1,5	9
Řepka olejná	ošetření osiva	15	10
Luskoviny	ošetření osiva	1,5	10
Slunečnice roční	ošetření osiva	2,0	10

LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ

Zbytky mořící kapaliny ani výplachové vody nesmí zasáhnout zdroje i recipienty povrchových vod. Zbytky v obalu se likvidují výplachem vodou, která se použije při následné přípravě „mořící kapaliny“. Prázdné obaly se recyklují.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě, abyste se vyvarovali rizik pro zdraví a životní prostředí.

Datum výroby, číslo šarže:

Výrobce: BIOSFOR s.r.o., Slepčovice 36
530 02 Pardubice 2, www.biosfor.eu

Výhradní distributor:
CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03
tel.: 603 848 617, www.chemapagro.cz

PN 01-100-02



Doba použitelnosti: 24 měsíců ode dne výroby.